

Лосьон «Комфорт вымени»

COMFORT UDDER CARE

Комплекс высокоэффективных эфирных масел и натуральных ингредиентов с выраженным антибактериальным действием

Применение лосьона «Комфорт вымени» Comfort Udder Care

- За три дня до отела
- При уплотнениях в вымени
- При отеках вымени
- При повышенном числе соматических клеток
- Всегда для поддержания вымени мягким и эластичным

Схема применения лосьона «Комфорт вымени» Comfort Udder Care

Обеспечить контакт лосьона непосредственно с поверхностью кожи, распыляя с расстояния 10-15 см; курс применения 4 дня 2 раза в день.



Применение при уплотнениях вымени:

начиная за три дня до отела 2 раза в день опрыскивать вымя с сосками, для их мягкости и эластичности; после отела продолжать применение, уже не опрыскивая сосков; если за 10-14 дней перед отелом наблюдается уплотнение вымени, в таком случае опрыскивать вымя 3 дня подряд 2 раза в день и возобновить применение за 3 дня до отела.

Применение при маститах:

при выявлении незамедлительно опрыскать воспаленную долю; 4 дня 2 раза в день; на третий день опрыскивания может произойти изменение состояния молока: из воспаленной доли начнут выходить хлопья, сгустки и гной, не спешите паниковать: запущенный механизм природного сопротивления бактериям начал приносить результаты и вымя очищается от инфекции; на следующий день молоко снова пригодно для пищевых целей; решение начинать ли лечение антибиотиками принимает ветеринарный врач (при повышенной температуре).

Применение при коли-инфекции (кишечной палочке E. coli):

первые 3 дня опрыскивать 4 раза в день, наблюдать за температурой животного и его потреблением корма; при легком заражении инфекцией в первый день показатели температура коровы и потребление корма в норме; при тяжелой стадии использовать антибиотики совместно с лосьоном; после первых трех дней продолжить опрыскивание еще 2 дня 2 раза в день.

Применение при высоком числе соматических клеток:

применять стандартный способ применения: 4 дня подряд 2 раза в день; у 60% животных реакция происходит незамедлительно и число соматических клеток понижается; для достижения показателей, соответствующих норме, 30% животных обрабатываются последующие 3-4 дня, так как речь идет о серьезных воспалительных процессах; 10% животных лечению с помощью лосьона не поддается, если, к примеру, причина воспаления золотистый стафилококк (*Staphylococcus aureus*), который в принципе трудно ликвидировать из-за его устойчивости к действию антибиотиков, к тому же он способен паразитировать внутри клеток.

При применении лосьона «Комфорт вымени» COMFORT UDDER CARE молоко сохраняет свою товарность!